


Mode d'emploi : 1) Découper ici 2) Plier en trois



Nature clé en main n°58 – Collection d'outils naturalistes Biodiversita

Ager les vautours

Biodiversita : un programme de formation et de projets naturalistes pour amateurs et professionnels
www.osi-biodiversita.org - Tel : 01 83 64 55 46

- Objectif de la fiche : Identification des âges des vautours de France continentale.
- Pour quelles espèces : Toutes les espèces de vautours nicheurs en France.

Après avoir identifié l'espèce


Pour démarrer la clé d'identification, vous devrez avoir préalablement identifié l'espèce dont il s'agit. Pour cela, vous pouvez vous aider de la fiche Nature clé en main n°3.

Vocabulaire

Rémiges pointues : c'est un premier plumage homogène et dont les extrémités sont pointues en dents de scies et de la même taille.

Rémiges arrondies : c'est une plume neuve qui a récemment été renouvelée.


Couvertures : ce sont les plumes qui recouvrent et protègent la base des grandes plumes de vol.



Rémiges primaires : Plumes du bout de l'aile servant à la portance.

Rémiges secondaires : Plume située entre le corps et le bout de l'aile servant à la stabilisation.

1




Âge ?

Cette clé considère l'individu d'un an lorsqu'il est dans sa première année de vie, deux ans lorsqu'il est dans sa deuxième année de vie etc.. Nous excluons un autre système de comptage qui comptabilise les hivers passés au 01 janvier de chaque année, et préférons compter à partir des dates d'anniversaire estimée.

2

Vautour fauve



Vocabulaire

Mue : Les oiseaux vont régulièrement remplacer leurs plumes usées pour en fabriquer des neuves. Les plumes tombent de façon symétrique sur les deux ailes en même temps. Les nouvelles plumes sont très arrondies. L'oiseau peut muer plusieurs plumes de vols simultanément. Le changement complet de l'ensemble du plumage va prendre plusieurs années.



3

Découper ici

Retrouvez toutes nos autres fiches :




Mode d'emploi : 1) Découper ici 2) Plier en trois



Couvertures alaires

- Couverture sur-alaire (sur le dessus de l'aile)
- Couverture sous-alaire (sur le dessous de l'aile)

Ces couvertures servent à protéger l'implantation des plumes de vol de l'abrasion avec le vent, et produit un effet de tuiles permettant à l'eau de pluie de ruisseler facilement sans entrer à l'intérieur du plumage.



Migration

Le Vautour percnoptère est le seul vautour nicheur de France à passer l'hiver au sud du Sahara. Ils partent entre fin août et début septembre pour revenir au printemps en France. Les jeunes individus peuvent même y rester plusieurs années avant de remonter en Europe.

Remarque

Il existe une variabilité importante dans les coloris des Vautours percnoptères de 2 à 4 ans. Aussi, il est très difficile d'utiliser ce seul critère pour déterminer l'âge de l'individu.

Ecllosion des oeufs

G barbu : entre février et avril – **V moine** : vers avril, mai
V fauve : de fin mars à début avril – **V percnoptère** : de fin mai à juin

Répartition géographique



Quelques autres fiches Biodiversita sur les rapaces

- ▲ Nature clé en main n°3 : Les rapaces en vol
- ▲ Nature clé en main n°38 : Les rapaces nocturnes

Vous aimez nos outils naturalistes ?

Faites un don pour soutenir la conception de ces outils :
 Scannez le QR code ou rendez-vous sur
<https://www.helloasso.com/associations/terra-biodiversita/formulaires/1>

Une fiche de l'association Terra biodiversita en partenariat avec l'ONG
 Objectif Sciences International
 Téléchargeable sur osi-biodiversita.org
 Réalisation : Maëlla Lainé, Hélène Lacoste Larnac
 Une création garantie 0 % IA générative & 100 % Intelligence humaine.
 Version 1.5 en date du 30/06/2026



En savoir plus sur nos projets :



↑ Découper ici

Retrouvez toutes nos autres fiches :

